

**Παράρτημα. Χαρακτηριστικά δηλωθέντων κρουσμάτων λοίμωξης από ιό Δυτικού Νείλου (ΔΝ), Ελλάδα, 2010-2023 (Πηγή: ΕΟΔΥ)**

**Πίνακας 1. Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων λοίμωξης από ιό ΔΝ, αριθμός θανάτων\*\* (% θνητότητα) σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό [στο σύνολο των κρουσμάτων και στα κρούσματα με προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ)], επίπτωση νόσου με προσβολή ΚΝΣ, Ελλάδα, 2010-2023 (Πηγή: ΕΟΔΥ)**

Μεταβλητή	Έτος														Σύνολο 2010-2023
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Σύνολο κρουσμάτων</b>	262	100	161	86	15	0	0	48	317	227	145	59	286	162	1.868
<b>Κρούσματα με προσβολή ΚΝΣ (%)</b>	197 (75%)	75 (75%)	109 (68%)	51 (59%)	14 (93%)	0	0	28 (58%)	243 (77%)	140 (62%)	116 (80%)	38 (64%)	184 (64%)	119 (73%)	1.314 (70%)
<b>Επίπτωση νόσου με προσβολή ΚΝΣ (ανά 100.000 πληθ)</b>	1,8	0,7	1,0	0,5	0,1	0	0	0,3	2,2	1,3	1,1	0,4	1,7	1,1	0,9*
<b>Αριθμός (%) θανάτων</b>	35 (13%)	9 (9%)	18 (11%)	11 (13%)	6 (40%)	0	0	5 (10%)	51 (16%)	35 (15%)	23 (16%)	8 (14%)	33 (12%)	23 (14%)	257 (14%)
<b>Αριθμός (%) θανάτων ασθενών με προσβολή ΚΝΣ</b>	33 (17%)	9 (12%)	18 (17%)	10 (20%)	6 (43%)	0	0	5 (18%)	48 (20%)	33 (24%)	23 (20%)	7 (18%)	33 (18%)	23 (19%)	248 (19%)

\* Μέση ετήσια επίπτωση ετών 2010-2022

\*\* Καταγράφονται οι θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από ιό ΔΝ, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

**Πίνακας 2. Αριθμός και ποσοστό κρουσμάτων λοίμωξης από ιό ΔΝ με προσβολή του ΚΝΣ ανά κλινική μορφή νευρο-δισιδυτικής νόσου (με προσβολή ΚΝΣ), Ελλάδα, 2010-2023 (Πηγή: ΕΟΔΥ)**

Κλινική μορφή νευρο-δισιδυτικής νόσου	%	Αριθμός κρουσμάτων
Εγκεφαλίτιδα/ Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα	88%	1.159
Μηνιγγίτιδα	11%	140
Οξεία χαλαρή παράλυση (ΟΧΠ) μόνο	1%	15
ΟΧΠ +/- εγκεφαλίτιδα/μηνιγγίτιδα*	4%*	55*
<b>Σύνολο κρουσμάτων με προσβολή του ΚΝΣ</b>	<b>100%</b>	<b>1.314</b>

\* Συμπεριλαμβάνονται και στις ανωτέρω κατηγορίες.

**Πίνακας 3. Αριθμός και ποσοστό κρουσμάτων λοίμωξης από ιό ΔΝ με προσβολή του ΚΝΣ ανά ηλικιακή ομάδα, Ελλάδα, 2010-2023 (Πηγή: ΕΟΔΥ)**

Ηλικιακή ομάδα (έτη)	%	Αριθμός κρουσμάτων
<20	1,4	19
20-29	1,4	18
30-39	3,4	45
40-49	3,8	50
50-59	9,1	119
60-69	17,5	230
70-79	33,9	445
≥80	29,5	388
<b>Σύνολο</b>	<b>100</b>	<b>1.314</b>

**Πίνακας 4. Ποσοστά (%)\* περιστατικών με λοίμωξη από ιό ΔΝ, με και χωρίς προσβολή του ΚΝΣ, ανά αναφερόμενο σύμπτωμα/ σημείο, Ελλάδα, 2010-2023 (Πηγή: ΕΟΔΥ)**

Σύμπτωμα (αναφερόμενο)/Σημείο	Ποσοστό (%) περιστατικών ΜΕ προσβολή ΚΝΣ με το αναφερόμενο σύμπτωμα/σημείο	Ποσοστό (%) περιστατικών ΧΩΡΙΣ προσβολή ΚΝΣ με το αναφερόμενο σύμπτωμα/σημείο
Πυρετός	99%	91%
Γενικευμένη αδυναμία/ καταβολή/κόπωση	78%	77%
Σύγχυση	77%	22%
Κεφαλαλγία	62%	61%
Υπνηλία	60%	27%
Ανορεξία	57%	51%
Διάρροια/ ναυτία/ έμετος	52%	47%
Ρίγος	51%	44%
Αίσθημα ζάλης	42%	26%
Αρθραλγίες/ μυαλγίες	37%	47%
Τρόμος/ εξωπυραμιδικά συμπτώματα	32%	2%**
Ασάθεια	26%	2%**
Εξάνθημα	16%	31%
Κοιλιακό άλγος	14%	17%
Παρέσεις/ παραλύσεις	13%	0%
Οπισθοβολβικός πόνος	12%	17%
Αιμωδίες	11%	5%
Θάμβος όρασης	9%	3%
Διογκωμένοι Λεμφαδένες	5%	16%

\* Τα ποσοστά υπολογίσθηκαν επί των περιστατικών για τα οποία ήταν γνωστή η σχετική πληροφορία.

\*\* Σύμπτωμα κατά αναφορά των ίδιων των ασθενών (ή συγγενών τους).

**Σε κάθε τυχόν περαιτέρω χρήση των ανωτέρω επιδημιολογικών δεδομένων, παρακαλούμε όπως αναφέρετε ότι η πηγή τους είναι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας («Πηγή δεδομένων: ΕΟΔΥ»).**