

Παράρτημα. Χαρακτηριστικά δηλωθέντων κρουσμάτων λοίμωξης από ιό Δυτικού Νείλου (ΔΝ), Ελλάδα, 2010-2024 (Πηγή: ΕΟΔΥ)

Πίνακας 1. Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων λοίμωξης από ιό ΔΝ, αριθμός θανάτων* (% θνητότητα) σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό [στο σύνολο των κρουσμάτων και στα κρούσματα με προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ)], επίπτωση νόσου με προσβολή ΚΝΣ, Ελλάδα, 2010-2024 (Πηγή: ΕΟΔΥ)

Μεταβλητή	Έτος																Σύνολο 2010-2024
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Σύνολο κρουσμάτων	262	100	161	86	15	0	0	48	317	227	145	59	286	162	220	2.088	
Κρούσματα με προσβολή ΚΝΣ (%)	197 (75%)	75 (75%)	109 (68%)	51 (59%)	14 (93%)	0	0	28 (58%)	243 (77%)	140 (62%)	116 (80%)	38 (64%)	184 (64%)	119 (73%)	157 (71%)	1.471 (70%)	
Επίπτωση νόσου με προσβολή ΚΝΣ (ανά 100.000 πληθ)	1,8	0,7	1,0	0,5	0,1	0	0	0,3	2,2	1,3	1,1	0,4	1,7	1,1	1,5	0,9**	
Αριθμός (%) θανάτων	35 (13%)	9 (9%)	18 (11%)	11 (13%)	6 (40%)	0	0	5 (10%)	51 (16%)	35 (15%)	23 (16%)	8 (14%)	33 (12%)	23 (14%)	35 (16%)	292 (14%)	
Αριθμός (%) θανάτων ασθενών με προσβολή ΚΝΣ	33 (17%)	9 (12%)	18 (17%)	10 (20%)	6 (43%)	0	0	5 (18%)	48 (20%)	33 (24%)	23 (20%)	7 (18%)	33 (18%)	23 (19%)	34 (22%)	282 (19%)	

* Καταγράφονται οι θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από ιό ΔΝ, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

** Μέση ετήσια επίπτωση ετών 2010-2024.

Πίνακας 2. Αριθμός και ποσοστό κρουσμάτων λοίμωξης από ιό ΔΝ με προσβολή του ΚΝΣ ανά κλινική μορφή νευρο-δισιδυτικής νόσου (με προσβολή ΚΝΣ), Ελλάδα, 2010-2024 (Πηγή: ΕΟΔΥ)

Κλινική μορφή νευρο-δισιδυτικής νόσου	%	Αριθμός κρουσμάτων
Εγκεφαλίτιδα/ Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα	89%	1.309
Μηνιγγίτιδα	10%	145
Οξεία χαλαρή παράλυση (ΟΧΠ) μόνο	1%	17
ΟΧΠ +/- εγκεφαλίτιδα/μηνιγγίτιδα*	4%*	60*
Σύνολο κρουσμάτων με προσβολή του ΚΝΣ	100%	1.471

* Συμπεριλαμβάνονται και στις ανωτέρω κατηγορίες.

Πίνακας 3. Αριθμός και ποσοστό κρουσμάτων λοίμωξης από ιό ΔΝ με προσβολή του ΚΝΣ ανά ηλικιακή ομάδα, Ελλάδα, 2010-2024 (Πηγή: ΕΟΔΥ)

Ηλικιακή ομάδα (έτη)	%	Αριθμός κρουσμάτων
<20	1,4	20
20-29	1,4	21
30-39	3,3	48
40-49	3,7	54
50-59	8,8	130
60-69	17,5	257
70-79	34,5	507
≥80	29,5	434
Σύνολο	100	1.471

Πίνακας 4. Ποσοστά (%)* περιστατικών με λοίμωξη από ιό ΔΝ, με και χωρίς προσβολή του ΚΝΣ, ανά αναφερόμενο σύμπτωμα/ σημείο, Ελλάδα, 2010-2024 (Πηγή: ΕΟΔΥ)

Σύμπτωμα (αναφερόμενο)/Σημείο	Ποσοστό (%) περιστατικών ΜΕ προσβολή ΚΝΣ με το αναφερόμενο σύμπτωμα/σημείο	Ποσοστό (%) περιστατικών ΧΩΡΙΣ προσβολή ΚΝΣ με το αναφερόμενο σύμπτωμα/σημείο
Πυρετός	99%	91%
Γενικευμένη αδυναμία/ καταβολή/κόπωση	80%	78%
Σύγχυση	77%	21%
Κεφαλαλγία	62%	59%
Υπνηλία	61%	27%
Ανορεξία	58%	52%
Διάρροια/ ναυτία/ έμετος	53%	47%
Ρίγος	52%	44%
Αίσθημα ζάλης	42%	26%
Αρθραλγίες/ μυαλγίες	37%	46%
Τρόμος/ εξωπυραμидικά συμπτώματα	31%	2%**
Ασάθεια	25%	2%**
Εξάνθημα	16%	30%
Κοιλιακό άλγος	14%	16%
Παρέσεις/ παραλύσεις	13%	0%
Οπισθοβολβικός πόνος	12%	16%
Αιμωδίες	10%	5%
Θάμβος όρασης	9%	3%
Διογκωμένοι Λεμφαδένες	5%	15%

* Τα ποσοστά υπολογίσθηκαν επί των περιστατικών για τα οποία ήταν γνωστή η σχετική πληροφορία.

** Σύμπτωμα κατά αναφορά των ίδιων των ασθενών (ή συγγενών τους).

Σε κάθε τυχόν περαιτέρω χρήση των ανωτέρω επιδημιολογικών δεδομένων, παρακαλούμε όπως αναφέρετε ότι η πηγή τους είναι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας («Πηγή δεδομένων: ΕΟΔΥ»).